



Figura 1 - Taxa de detecção de sífilis adquirida (por 100.000 habitantes), taxa de detecção de sífilis em gestantes e taxa de incidência de sífilis congênita (por mil nascidos vivos), segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)
 Nota: *Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.


Figura 2 - Casos e taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG) por 1.000 nascidos vivos (NV) segundo ano diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.


Figura 3 - Casos de sífilis em gestantes, segundo faixa etária e ano diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

Figura 4 - Percentual de casos de sífilis em gestantes com pré-natal, segundo trimestre gestacional de diagnóstico e ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

■ 1º trimestre ■ 2º trimestre ■ 3º trimestre ■ Ign/Branco

Figura 5 - Distribuição percentual de sífilis em gestantes com realização de teste não treponêmico (VDRL) e teste treponêmico, durante o pré-natal, segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 2018*.




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

**Não foram incluídas gestantes diagnosticadas e notificadas no parto: 1.372 gestantes em 2018.

■ Teste não treponêmico (VDRL) ■ Teste treponêmico

Figura 6 - Distribuição percentual de sífilis em gestantes com tratamento prescrito com penicilina (ao menos uma dose) e prescrito conforme classificação clínica da doença, durante o pré-natal, segundo ano de diagnóstico. Estado de São Paulo, 2007 a 201




Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

**Não foram incluídas gestantes diagnosticadas e notificadas no parto: 1.372 gestantes em 2018.

■ Prescrição de penicilina ■ Prescrição conforme classificação clínica


Figura 7 - Taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG), por mil nascidos vivos (NV), segundo Região de Saúde (RS) de residência. Estado de São Paulo, 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.


Figura 8 - Taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG) por mil nascidos vivos (NV), segundo Departamento Regional de Saúde (DRS) de residência. Estado de São Paulo, 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)

*Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.

Figura 9 - Taxa de detecção de sífilis em gestantes (TDSG), por mil nascidos vivos (NV), segundo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de residência. Estado de São Paulo, 2018*.



Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual IST/AIDS-SP (VE-PEIST/AIDS-SP)
 *Dados preliminares até 30/06/2019 sujeitos a revisão mensal.