

RECOMENDAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS PARENTERAIS

VACINA	APRESENTAÇÃO	DOSAGEM	VIA	LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO	VALIDADE DO FRASCO APÓS ABERTO OU DILUÍDO*
BCG (vacina de tuberculose)	Produto liofilizado ampola com múltiplas doses e diluentes	0,1 ml	ID	inserção inferior do músculo deltóide direito	6 horas
TETRA (vacina de tétano, difteria, coqueluche, e Haemophilus influenzae b)	Frasco-ampola com múltiplas doses (Hib Liofilizado e DTP Líquido como diluente)	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa em < de 2 anos e região dorsoglútea ou deltóide em > de 2 anos	5 dias
DTP (vacina de tétano, difteria e coqueluche)	Frasco- ampola com múltiplas doses	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa, região dorsoglútea, ventroglútea ou deltóide	15 dias
dT (vacina de difteria e tétano)	Frasco- ampola com múltiplas doses	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa, região dorsoglútea ou ventroglútea	15 dias
SCR (vacina de sarampo, caxumba, e rubéola)	Produto Liofilizado frasco- ampola com múltiplas doses e diluentes	0,5 ml	SC	região posterior do antebraço(1ª escolha) ou dorsoglútea	8 horas
Hepatite B	Frasco ampola com múltiplas doses	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa em menores de 2 anos e região deltóide em maiores de 2 anos	até o final do frasco prazo máximo 4 semanas
Febre Amarela	Produto Liofilizado frasco-ampola com múltiplas doses e diluentes	0,5 ml	SC	região posterior do antebraço (1ª escolha) ou dorsoglútea	6 horas
Hib (vacina de Haemophilus influenzae b)	Frasco-ampola com dose única ou múltiplas doses e diluente	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa em < de 2 anos e região dorsoglútea ou deltóide em > de 2 anos	5 dias
Influenza	Frasco-ampola múltiplas doses ou seringa com dose única	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa em < de 2 anos e região dorsoglútea ou deltóide em > de 2 anos	até 7 dias
Pneumo 23	Frasco-ampola com dose única ou seringa com dose única	0,5 ml	IM	região deltóide	uso imediato
Raiva Humana	Produto Liofilizado frasco-ampola com dose única de vacina de cultivo celular e diluente	de acordo com tipo de profilaxia, pré ou pós exposição	IM	face anterolateral da coxa em < de 2 anos e região deltóide em > de 2 anos	uso imediato
Meningocócica Conj C	Frasco- ampola unidose e diluente	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa em < de 2 anos e região dorsoglútea ou deltóide em > de 2 anos	uso imediato
Pneumocócica 10 Valente	Frasco-ampola unidose	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa em < de 2 anos e região dorsoglútea ou deltóide em > de 2 anos	uso imediato
Pentavalente (vacina de tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus influenzae b e hepatite b)	Frasco-ampola unidose	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa em < de 2 anos e região dorsoglútea ou deltóide em > de 2 anos	uso imediato
VIP	Frasco-ampola multidose	0,5 ml	IM	face anterolateral da coxa em < de 2 anos e região deltóide em > de 2 anos	7 dias

*Sujeito a mudanças.