

# Abordagem para prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea em serviços de Diálise

## 1. Vigilância e feedback

Realizar vigilância mensal das ICS e outros eventos de diálise usando os critérios da ANVISA. Calcule as taxas e compare com as taxas de outros serviços de diálise. Compartilhe ativamente resultados com a equipe clínica da linha de frente.

## 2. Observações de higiene das mãos

Realizar observações das oportunidades de higiene das mãos mensalmente e compartilhar resultados com a equipe.

## 3. Observações sobre cuidados com cateter/ acesso vascular

Realizar observações dos cuidados com cateteres de diálise trimestral. Avaliar a adesão da equipe à técnica asséptica quando conectar e desconectar cateteres e durante trocas de curativos. Compartilhe resultados com a equipe.

## 4. Educação e capacitação da equipe

Treinar a equipe em tópicos de controle de infecção, incluindo cuidados com os cateteres e técnica asséptica. Realizar avaliação de habilidades como os cuidados com o cateter a cada 6-12 meses e mediante contratação.

### 1. Educação/engajamento do paciente

Fornecer educação padronizada a todos os pacientes sobre prevenção de infecções com tópicos incluindo cuidados com cateter, higiene das mãos, riscos relacionados a uso do cateter, reconhecimento de sinais de infecção e instruções para gerenciamento do cateter quando fora da unidade de diálise.

### 2. Redução do uso de cateter

Incorporar esforços (por exemplo, através da educação do paciente, coordenador de acesso vascular) para reduzir o uso de cateteres, identificar e abordar barreiras à colocação de acesso vascular permanente e remoção de cateter.

### 3. Antissepsia da pele com clorexidina

Usar uma solução de clorexidina alcóolica a 2% como agente antisséptico cutâneo de primeira linha para inserção do cateter venoso central e durante trocas de curativos (PVPI - de preferência com álcool ou álcool a 70% são alternativas para pacientes com intolerância à clorexidina).

### 4. Desinfecção do hub do cateter

Esfregue os conectores do cateter com um antisséptico apropriado após a remoção da tampa e antes de acessá-los. Execute a cada momento em que o cateter é acessado ou desconectado.

### 5. Pomada antimicrobiana

Aplique pomada antibiótica ou pomada de iodopovidona nos locais de saída do cateter durante a troca do curativo.



Esse documento é uma tradução livre dos documentos de orientação do CDC (Centers for Disease Control and Prevention).