

ANGIOEDEMA

Portaria SAS/MS nº 880, de 12 de julho de 2016 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Danazol 100 mg – cápsula 200 mg – cápsula](#)

CID's contemplados

D84.1

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

ANGIOEDEMA TIPO 1 E 2:

- C1-INH (Inibidor de C1-esterase);
- CH50 (Complemento total);
- C4 (C4 Componente do complemento).

Renovação da Continuidade

ANGIOEDEMA TIPO 1 E 2:


Após primeiro mês:

- C1-INH (Inibidor de C1-esterase).

Semestralmente:

- Hematócrito;
- Hemoglobina;
- Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – fosfatase alcalina;
- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

ANGIOEDEMA (Atualizado em 23/06/2021)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Equação de Friedewald: $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

- Urina tipo I.

À critério do médico prescritor:

- Laudo/relatório médico da ultrassonografia abdominal.

ANGIOEDEMA (Atualizado em 23/06/2021)

