

ÁCIDO TRANEXÂMICO

Hemofilia A

Informações gerais

Apresentação: 250 mg – comprimido

CID-10: D66

Esquema terapêutico recomendado:

O ácido tranexâmico é geralmente utilizado na dose de 10 mg/kg/dose, por via intravenosa a cada 8 horas e 15–20 mg/kg de peso por dose a cada 8 horas, por via oral, durante 3 a 10 dias, na dependência do local e gravidade do evento hemorrágico.

Para sangramentos na cavidade bucal, os antifibrinolíticos podem ser usados como bochecho, por meio da diluição do comprimido em água ou sob forma de pasta, por meio da maceração dos comprimidos (1 comprimido misturado em água ou com soro fisiológico ou solução anestésica), que são colocados em gaze ou mesmo diretamente sobre a ferida cirúrgica.

Responsável pelo financiamento: Ministério da Saúde

Observações:

Conservar em temperatura 15° a 25° C.

Caso sejam utilizados em associação ao COMPLEXO PROTROMBÍNICO PARCIALMENTE ATIVADO (CCPA), deve-se manter intervalo mínimo de 6 horas entre a administração dos dois produtos.

Para mais informações:

- [Manual de Hemofilia](#), publicado pelo Ministério da Saúde

Dispensação do medicamento

A dispensação do medicamento é realizada exclusivamente a pacientes que em acompanhamento regular em um dos [Centros de Referência para Tratamento de Coagulopatias Hereditárias](#).

A SES/SP não fornece o medicamento diretamente aos pacientes.

ÁCIDO TRANEXÂMICO – HEMOFILIA A (Atualizado em 06/09/2017)

