

## ACETATO DE DESMOPRESSINA (1-deamino-8-D-arginina vasopressina, DDAVP)

### Doença de von Willebrand (exceto tipo 3 e subtipo 2B)

#### Informações gerais

**Apresentação:** 4 mcg/mL – solução injetável; 15 mcg/mL – solução injetável

**CID-10:** D68.0

#### Esquema terapêutico recomendado:

O DDAVP pode ser administrado por via intravenosa, subcutânea ou intranasal.

As doses de DDAVP podem ser repetidas a cada 12 ou 24 horas, por duas a três doses. Após a terceira dose, deve-se aguardar em média cinco dias para reinício de seu uso de forma eficaz.

O DDAVP deve ser administrado de 30 a 60 minutos antes de uma intervenção cirúrgica quando utilizado pela via endovenosa e 60 minutos antes de uma intervenção cirúrgica quando utilizado pela via subcutânea.

#### Para uso intravenoso:

0,2 mg/kg a 0,4 mg/kg de peso. Recomenda-se a diluição em 50 mL a 250 mL de solução salina e infundido durante 30 a 40 minutos. O pico da concentração de fator VIII e fator de von Willebrand ocorre após 30 a 60 minutos do término da infusão.

#### Para uso subcutâneo:

0,2 mg/kg a 0,4 mg/kg de peso. Apresentação de 15 mg/ml permite seu uso por meio de injeções subcutâneas, cujo pico de concentração do fator VIII e fator de von Willebrand ocorre após 60 a 120 minutos após sua administração.

**Responsável pelo financiamento:** Ministério da Saúde


#### Observações:

Conservar em temperatura 2° a 8°C.

A solução injetável não deve ser armazenada após a abertura da ampola.

Para mais informações:

- [Manual de Hemofilia](#), publicado pelo Ministério da Saúde
- [Manual de diagnóstico e tratamento da doença de von Willebrand](#), publicado pelo Ministério da Saúde



## Dispensação do medicamento

A dispensação do medicamento é realizada exclusivamente a pacientes que em acompanhamento regular em um dos [Centros de Referência para Tratamento de Coagulopatias Hereditárias](#).

A SES/SP não fornece o medicamento diretamente aos pacientes.

