

FATOR VII ATIVADO RECOMBINANTE

Deficiência do fator VII de coagulação

Informações gerais

Apresentação: 1 mg (50 KUI) – pó liofilizado para solução injetável; 2 mg (100 KUI) – pó liofilizado para solução injetável; 5 mg (250 KUI) – pó liofilizado para solução injetável

CID-10: D68.2

Esquema terapêutico recomendado:

Tratamento de reposição:

A concentração plasmática do FVII necessária para hemostasia é de 15 UI/dl–20 UI/dl (15%–20%), sendo assim, é raramente necessária a reposição de FVII para indivíduos que apresentam atividade de fator superior a 20%.

A dose recomendada é de 15 µg/kg–30 µg/kg de peso. A frequência das doses varia conforme a gravidade da manifestação hemorrágica. Para os sangramentos leves a moderados, como por exemplo, hemartrose, uma dose única de FVIIa-r pode ser suficiente para cessar a hemorragia. Para os episódios hemorrágicos graves, como por exemplo, cirurgia de grande porte, o FVIIa-r deve ser administrado a cada 4 a 6 horas por vários dias (Tabela 2). Havendo indicação, o tratamento de reposição com FVIIa-r pode ser associado a antifibrinolíticos, como o ácido tranexâmico. O desenvolvimento de inibidor pode ocorrer após administração do FVIIa-r, mas é raro.

Procedimento/Situações clínicas	Reposição de FVII
Hemartrose	FVIIa-r 15 µg/kg–30 µg/kg ou CCP 10 UI/kg
Extração dentária	FVIIa-r 15 µg/kg–30 µg/kg dose única antes do procedimento + antifibrinolítico ou CCP 10 UI/kg dose única antes do procedimento
Menometrorragia	Anticoncepcional + antifibrinolítico
Cirurgia de pequeno porte	FVIIa-r 15 µg/kg–30 µg/kg a cada 6 horas por 1–3 dias
Cirurgia de grande porte	FVIIa-r 15 µg/kg–30 µg/kg a cada 4–6 horas por 7–10 dias

Tratamento profilático:

A profilaxia secundária pode estar indicada nos pacientes com deficiência grave de FVII que apresentam hemartrose de repetição ou hemorragia intracraniana. A profilaxia pode ser realizada com FVIIa-r, 20 µg/kg–40 µg/kg 2 a 3 vezes por semana.



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

Responsável pelo financiamento: Ministério da Saúde

Observações:

Conservar em temperatura 15° a 30°C.

Mais informações:

- [Manual de Coagulopatias Hereditárias Raras](#), publicado pelo Ministério da Saúde;

Dispensação do medicamento

A dispensação do medicamento é realizada exclusivamente a pacientes que em acompanhamento regular em um dos [Centros de Referência para Tratamento de Coagulopatias Hereditárias](#).

A SES/SP não fornece o medicamento diretamente aos pacientes.

