

DASATINIBE

Leucemia Mieloide Crônica do Adulto

Portaria SAS/MS nº 1.219, de 04 de novembro de 2013, retificada em 07/01/2015 ([Protocolo na íntegra](#))

Informações gerais

Dosagem / Apresentação: 20 mg e 100 mg – comprimido

CIDs contemplados: C92.1

Procedimentos relacionados (SIGTAP):

Idade mínima – 19 anos

- 03.04.03.008-2 - Quimioterapia da Leucemia Mielóide Crônica em Fase Blástica - 2ª linha
- 03.04.03.014-7 - Quimioterapia de Leucemia Mielóide Crônica em Fase de Transformação - 2ª linha
- 03.04.03.022-8 – Quimioterapia de Leucemia Mielóide Crônica em Fase Crônica – 2ª linha

Tipo de financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Observações:

Medicamento inserido na Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer.

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

Solicitação do medicamento

Os [hospitais oncológicos habilitados na alta complexidade em oncologia no SUS](#) são os responsáveis pela solicitação do medicamento à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo não fornece o medicamento diretamente aos pacientes.

Para orientações: medicamentosoncológicos@saude.sp.gov.br.

Pacientes que não estão em acompanhamento em um hospital oncológico habilitado na alta complexidade em oncologia no SUS: Procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para orientações e encaminhamento a um serviço habilitado.

DASATINIBE – LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA DO ADULTO (Atualizado em 05/09/2017)

