

TRASTUZUMABE

Carcinoma de Mama HER-2 Positivo

Portaria Conjunta nº 04, de 23 de Janeiro de 2018 ([Protocolo na íntegra](#))

Informações gerais

Dosagem / Apresentação: 150 mg – frasco-ampola

CIDs contemplados: C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9

Procedimentos relacionados (SIGTAP):

Idade mínima – 19 anos

- 03.04.02.041-9 – Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo – 1ª linha
- 03.04.02.042-7 – Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo – 1ª linha
- 03.04.04.018-5 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio III (prévia)
- 03.04.05.026-1 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio I (adjuvante)
- 03.04.05.029-6 - Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio I (adjuvante)
- 03.04.05.027-0 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio II (adjuvante)
- 03.04.05.030-0 - Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio II (adjuvante)
- 03.04.05.028-8 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio III (adjuvante)
- 03.04.05.031-8 - Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio III (adjuvante)

Observações:

Medicamento inserido na Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer.

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

Solicitação do medicamento

Os [hospitais oncológicos habilitados na alta complexidade em oncologia no SUS](#) são os responsáveis pela solicitação do medicamento à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A SES/SP não fornece o medicamento diretamente aos pacientes.

Para orientações: medicamentosoncologicos@saude.sp.gov.br.

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Medicamentos oncológicos

Pacientes que não estão em acompanhamento em um hospital oncológico habilitado na alta complexidade em oncologia no SUS: Procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para orientações e encaminhamento a um serviço habilitado.