

O vírus HPV, o câncer do colo de útero e verrugas genitais

Dr. José Carlos Sadalla

Câncer de Colo Uterino

- Câncer pélvico mais frequente
- 2º. câncer ginecológico
- 4ª. causa de morte por CA no Brasil
- Estimativa de 17.540 casos novos (2012)
- 4.986 mortes (2010)

Epidemiologia

- Tipo histológico
 - CEC (90%)
 - Adenocarcinoma (10%)



Fatores de Risco

- HPV
- Início precoce de atividade sexual
- Atividade sexual promíscua / Parceiro sexual de risco
- Nível sócio-econômico baixo (CEC)
- Paridade
- Imunodepressão
- Contraceptivos orais
- Tabagismo

Fatores de Risco

- Início precoce de atividade sexual
 - <15 anos
- Atividade sexual promíscua
 - >2 parceiros em 12 meses
 - > 5 parceiros na vida
- Parceiro sexual de risco

Fatores de Risco

- Nível sócio-econômico baixo (CEC)
- Paridade
 - Multípara (5 ou mais) 3x mais que nulípara

Fatores de Risco

- Imunodepressão (HIV+ e transplantadas)
 - Incidência de NIC ↑
 - Regressão de NIC ↓
 - Incidência de CA invasor ↑

Fatores de Risco

- Contraceptivos orais
 - Aumento do risco em usuárias de longo prazo (mais de 5 anos de uso)
 - Associação com HPV aumenta 3x o risco
 - Aumento do CA “in situ” (\uparrow 8x adeno “in situ”)
 - Bias: não usar condom
 - Estradiol estimularia E6/E7

Fatores de Risco

- Tabagismo
 - Principal fator de risco ambiental
 - Fator prognóstico p/ recidiva e morte
 - Relação com oncogenes ??

Etiologia

- HPV
 - Lesões epiteliais de alto grau
 - Carcinomas invasores
 - 99% CEC
 - 90% AdenoCA
 - Tipos mais encontrados: 16 e 18 (60-80%)

Infecção HPV

- Indolente
- 90% - resolução
- 10% - portador
 - 90% sem intercorrências
 - 10% LIE ou CA

Fatores de Proteção

- Preservativo
- Vacina para HPV
 - Bivalente: 16 e 18.
 - Quadrivalente: 6, 11, 16 e 18.

Verrugas Genitais

- Principal etiologia: HPV
- Baixo risco de câncer de vulva
- Tipos HPV mais frequentes: 6 e 11



OBRIGADO



**Complexo do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo**



**Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo**