

INTERVALO ENTRE AS DOSES DE VACINAS*

VACINA	ESQUEMA	IDADE PRECONIZADA	IDADE MÍNIMA PARA A 1ª DOSE	INTERVALOS MÍNIMOS ENTRE AS DOSES E OU REFORÇOS			
				Entre 1ª e 2ª dose	Entre a 2ª e 3ª dose	1º Ref	2º Ref
BCG (vacina de tuberculose)	dose única	ao nascimento	a partir do nascimento	—	—	—	—
Esquema Sequencial VIP/VOP ¹	3 doses 2 Reforços	2, 4 e 6 meses	6 semanas	30 dias	30 dias	6 meses a 1 ano após a última dose do esquema básico	entre 4 a 6 anos de idade
Pentavalente ₂ (vacina de tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus influenzae b e hepatite b)	3 doses	2, 4 e 6 meses	6 semanas	4 semanas	4 semanas	—	—
Rotavirus humano ³	2 doses	2 e 4 meses ⁴	1 mês e 15 dias	4 semanas	—	—	—
Pneumo 10 Valente	3 doses 1º Reforço	3, 5 e 7 meses	6 semanas	30 dias	30 dias	2 meses após a última dose, do esquema no menor 1 ano	—
Meningocócica Conj C	2 doses 1º Reforço	3, 5 meses	6 semanas	30 dias	30 dias	60 dias após a última dose, preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade	—
DTP (vacina de tétano, difteria e coqueluche)	doses de reforço	1º Reforço - 15 meses 2º Reforço entre 4 e 6 anos	6 semanas	—	—	6 meses após o término da vacinação básica	Entre 4 e 6 anos de idade
SCR (vacina sarampo, caxumba, e rubéola)	2 doses	12 meses 15 meses	12 meses ⁵	4 semanas	—	—	—
Febre Amarela	dose única	9 meses	9 meses	—	—	a cada 10 anos	—
Influenza	dose única anual ⁶		6 meses	—	—	—	—
dT (vacina de difteria e tétano) ⁷	3 doses	crianças a partir de 7 anos, adolescentes e adultos que não receberam a DTP ou sem comprovação	7 anos	4 semanas	4 semanas	a cada 10 anos para que tenha esquema básico completo ⁸	—

NOTA * sujeito a alteração

1 Esquema Sequencial VIP/VOP: introduzida no calendário básico e 2012 e compreende o esquema básico de vacinação de Poliomielite

2 Pentavalente: introduzida no calendário básico em 2012

3 Rotavírus: o esquema vacinal **não** pode ser iniciado em crianças com mais de 3 meses e 15 dias.

4 Rotavírus: 1º dose idade mínima 1 mês e 15 dias máxima 3 meses e 15 dias . 2º dose mínima 3 meses e 15 dias máxima até 7 meses e 29 dias.

5 SCR: em situações de bloqueio poderá ser administrada a partir de 6 meses, porém não será considerada dose válida para a rotina.

6 Influenza: em crianças entre 6 meses e menores de 2 anos na primeira vacinação deverão receber 2 doses com intervalo de 30 dias (mínimo 21 dias

7 Dupla Adulto: para crianças a partir de 7 anos, adolescentes e adultos que não receberam a DTP ou sem comprovação

8 Dupla Adulto: O reforço deve ser antecipado se a última dose foi aplicada entre 5 e 10 anos, em gestante ou na presença de ferimento profundo e/ou contaminado

