

DOENÇA DE FABRY

Portaria conjunta SAES/SECTICS nº 2, de 15 de janeiro de 2025 ([Protocolo na íntegra](#))

Medicamentos

- [Alfagalsidase 1 mg/mL – frasco ampola de 3,5 mL](#)

CID's contemplados

E75.2

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

Cópia dos exames:

- Atividade da enzima α GAL-A inferior a 5% dos valores normais **ou**;
- Análise do DNA que demonstre mutação patogênica do gene que codifica a enzima α GAL -A;

Para homens com 18 anos ou mais de idade:

- Relatório médico descrevendo sinais e/ou sintomas de suspeita clínica (fenótipo clássico, com sintomas ou sinais precoces de envolvimento de órgãos-alvo) **ou**;
- Albuminúria ou proteinúria, alteração histológica renal (apagamento dos pedicelos ou sinais moderados ou graves de inclusões de GL-3 e sinais de glomerulosclerose no tecido renal), taxa de filtração glomerular (TFG) entre 60 e 90 mL/min/1,73 m² ou TFG < 60 mL/min/1,73 m², mesmo que outros sintomas estejam ausentes.

Para mulheres com 18 anos ou mais de idade:

- Relatório médico descrevendo sinais e/ou sintomas de suspeita clínica (fenótipo clássico, com sintomas ou sinais precoces de envolvimento de órgãos-alvo) **ou**;
- Albuminúria ou proteinúria, alteração histológica renal (apagamento dos pedicelos ou sinais moderados ou graves de inclusões de GL-3 e sinais de glomerulosclerose no tecido renal), taxa de filtração glomerular (TFG) entre 60 e 90 mL/min/1,73 m² ou TFG < 60 mL/min/1,73 m²



Renovação da Continuidade

A critério do médico prescritor:

- Eletrocardiograma (ECG);
- TFG – Taxa de Filtração Glomerular;

Para orientações sobre como obter os medicamentos, [clique aqui](#).