

## PAUTA 41

Análise para envio de Medicamentos IOT que estão com o estoque acima de 10.000 ampolas na reserva estratégica para estados com cobertura inferior a 15 dias

Segue abaixo análise realizada para todos os estados que apresentam cobertura dos fármacos **besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL; besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL; brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL; citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL; sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL; etomidato 2 mg/mL, frasco-ampola 10 mL; cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL** abaixo de 15 dias, conforme semana 44 de monitoramento.

### **Resumo:**

- Os medicamentos listados são os que apresentam quantitativo superior a 10.000 unidades na reserva estratégica;
- Os quantitativos a serem enviados foram determinados a partir do estoque de cada um dos medicamentos;
- O CMM considerado refere-se à semana 44 atualizada pelo CONASS;

#### **1- Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL**

##### Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 44 da Planilha CONASS;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

##### Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, optamos em sugerir a distribuição para os de maior criticidade (os que possuem cobertura menor que 5 dias):

1. Estados com cobertura menor que 5 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 4,5 dias;

#### **2- Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL**

##### Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 44 da Planilha CONASS;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal;
4. Estados que não serão contemplados na pauta de distribuição de besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL.

##### Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados com cobertura menor que 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 10 dias.

**3- Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL**

**Critérios utilizados para seleção dos estados:**

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 44 da Planilha CONASS;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

**Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:**

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, optamos em sugerir a distribuição para os de maior criticidade (os que possuem cobertura menor que 5 dias):

1. Estados com cobertura menor que 5 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 4,5 dias.

**4- Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL**

**Critérios utilizados para seleção dos estados:**

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 44 da Planilha CONASS;
2. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

**Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:**

1. Estados com cobertura menor que 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias.

**5- Sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL**

**Critérios utilizados para seleção dos estados:**

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 44 da Planilha CONASS;
2. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

**Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:**

2. Estados com cobertura menor que 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 20 dias.

**6- Etomidato 2 mg/mL, frasco-ampola 10 mL**

**Critérios utilizados para seleção dos estados:**

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 44 da Planilha CONASS;
2. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

**Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:**

1. Estados com cobertura menor que 15 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 15 dias.

**7- Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL**

**Critérios utilizados para seleção dos estados:**

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias considerando a semana 44 da Planilha CONASS;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal.

**Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:**

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, optamos em sugerir a distribuição para os de maior criticidade (os que possuem cobertura menor que 5 dias):

1. Estados com cobertura menor que 4 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 4,5 dias.
2. Estados com cobertura igual a 4 dias: quantitativo para atingir a cobertura de 5 dias.

**Pauta 41 - Quantitativos distribuídos considerando os critérios apresentados acima e o fator de embalagem.**

Estados	Medicamentos	Fator de Embalagem	Quantitativo
Acre	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	6.275
Acre	Sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL	50	2.550
Alagoas	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	22.375
Alagoas	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	3.485
Amapá	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	4.950
Amapá	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	8.310
Amapá	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	2.700
Amapá	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	17.240
Amapá	Etomidato 2 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	375
Amazonas	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	1.500
Amazonas	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	10.450
Amazonas	Sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL	50	42.900
Bahia	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	6.950
Ceará	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL	10	23.480
Ceará	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	11.190
Ceará	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	55.200
Ceará	Sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL	50	108.900
Distrito Federal	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	2.325
Distrito Federal	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	1.190

<b>Goiás</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	8.400
<b>Goiás</b>	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	8.690
<b>Goiás</b>	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	5.890
<b>Maranhão</b>	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL	10	1.800
<b>Maranhão</b>	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	8.750
<b>Mato Grosso</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	1.075
<b>Mato Grosso</b>	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	22.150
<b>Mato Grosso do Sul</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	71.200
<b>Mato Grosso do Sul</b>	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	18.090
<b>Mato Grosso do Sul</b>	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	14.035
<b>Mato Grosso do Sul</b>	Sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL	50	31.750
<b>Minas Gerais</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	10.025
<b>Pará</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	7.500
<b>Paraíba</b>	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL	10	4.650
<b>Paraíba</b>	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	2.880
<b>Paraíba</b>	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	5.050
<b>Paraná</b>	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL	10	4.680
<b>Pernambuco</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	12.825
<b>Rio de Janeiro</b>	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	69.275
<b>Rio de Janeiro</b>	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	20.195
<b>Rio Grande do Norte</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	1.825
<b>Rio Grande do Norte</b>	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	3.150
<b>Rio Grande do Norte</b>	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	7.530
<b>Rio Grande do Norte</b>	Sulfato de morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL	50	6.700
<b>Rio Grande do Sul</b>	Etomidato 2 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	97.475
<b>Rondônia</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	2.025
<b>Rondônia</b>	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	7.330
<b>Rondônia</b>	Etomidato 2 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	1.325
<b>Roraima</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	75
<b>Roraima</b>	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	680
<b>Roraima</b>	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	10.500
<b>Roraima</b>	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	2.695
<b>Santa Catarina</b>	Besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL	10	18.610
<b>São Paulo</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	16.025
<b>Sergipe</b>	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	6.975
<b>Sergipe</b>	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	7.650
<b>Sergipe</b>	Cloridrato de midazolam 5 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	2.395
<b>Sergipe</b>	Etomidato 2 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	5	3.375
<b>Tocantins</b>	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, frasco-ampola 10 mL	25	7.075
<b>Total</b>			<b>864.670</b>