

## CARBONATO DE CÁLCIO

Tratamento e prevenção da deficiência de cálcio (hipocalcemia) ou hiperfosfatemia (ex: osteoporose, osteomalácia, insuficiência renal); prevenção de pré-eclâmpsia e síndromes hipertensivas gestacionais em gestantes, e como antiácido.

### Informações gerais

**Apresentação:** 500 mg – comprimido

#### Dose diária usual:

- Adultos:

Complemento à dieta: 500 mg a 2.000 mg/dia, fracionados em 2-4 administrações

Prevenção de pré-eclâmpsia: 1.000 a 2.000 mg/dia, em doses divididas, iniciando a partir da 16ª semana e continuando até a 36ª semana da gestação

Hipocalcemia: 1.000-2.000mg/dia, fracionados em 3-4 administrações

Antiácido: 1.500 mg/dia

Hiperfosfatemia: 2500mg/dia

Osteoporose (adultos > 51anos): 1200mg/dia

- Crianças até 9 anos: 500 mg/dia

#### Dose diária máxima:

Complemento à dieta: 4.000 mg/dia

Hipocalcemia: 2.000 mg/dia

Antiácido: 8.000 mg/dia

Hiperfosfatemia: 3.750 mg/dia (na doença renal crônica)

#### Observações:

Classificação do medicamento: suplemento mineral

Orientações para administração do medicamento: Deve ser ingerido, preferencialmente, junto ou imediatamente após refeição leve.

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

### Documentos necessários para dispensação do medicamento

1. Prescrição original completa, legível, sem rasuras ou emendas, elaborada pelo profissional médico responsável pelo atendimento ao paciente, contendo:

CARBONATO DE CÁLCIO (Atualizado em 25/06/2025)



## COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR

Componente Básico da Assistência Farmacêutica – Farmácia Dose Certa

- Nome completo do paciente;
- Nome, endereço, telefone ou identificação da Unidade de Saúde;
- Nome do princípio ativo do medicamento (sem abreviaturas);
- Forma farmacêutica e concentração / dosagem do medicamento (em sistema métrico);
- Posologia: Modo de usar o medicamento, via de administração e duração do tratamento;
- Data;
- Identificação completa do prescritor, em carimbo ou manuscrito (nome e número de inscrição no Conselho Profissional do Estado de São Paulo);
- Assinatura do prescritor.

ATENÇÃO: O prazo de validade da receita será considerado a partir de sua data de emissão. Para este medicamento a validade é de 180 dias, limitadas a 6 (seis) dispensações que ocorrerão com intervalo de retirada de 30 (trinta) dias, podendo ser antecipado em até 5 (cinco) dias úteis desde que seja para a manutenção do tratamento.

Prescrições com a indicação de uso “se necessário” não serão aceitas.

2. Relatório médico com a justificativa para uso do medicamento em dose diária superior a dose diária máxima recomendada na bula do medicamento, se pertinente;
3. Cartão Nacional de Saúde (CNS) do paciente.

### Reclamações e dúvidas

Para quaisquer esclarecimentos sobre produtos da Fundação para o Remédio Popular – FURP e serviços das Unidades Farmácia Dose Certa:

Telefones: DDG – 0800 055 1530

Endereço eletrônico: [sac@furp.sp.gov.br](mailto:sac@furp.sp.gov.br)

CARBONATO DE CÁLCIO (Atualizado em 25/06/2025)

