

## FLUCONAZOL

### Infecção oportunista relacionada à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)

#### Informações gerais

**Apresentação:** 100 mg - comprimido.

**CID-10:** B204

#### Esquema terapêutico recomendado:

- tratamento de candidíase orofaríngea e esofageana:

200 mg, via oral, uma vez no primeiro dia.

Após o primeiro dia: 100 mg, via oral, uma vez ao dia por até 14 dias

- alternativa ou coadjuvante no tratamento de criptococose:

de 400 mg, via oral, uma vez ao dia a 400 mg, via oral, de 12 em 12 horas.

- profilaxia secundária de criptococose:

200 mg, via oral, uma vez ao dia.

- tratamento de infecções fúngicas em crianças:

3 a 12 mg/kg/dia, via oral, a depender da indicação clínica.

**Responsável pelo financiamento:** Secretaria de Estado da Saúde

#### Observações:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

Mais informações: [Deliberação CIB 25, de 16/06/2011](#)

#### Solicitação do Medicamento

O paciente ou seu representante deve entrar em contato com uma das [Unidades Dispensadoras de Medicamentos \(UDM\)](#) para informações da documentação e processos exigidos para a retirada dos medicamentos.