

ZIDOVUDINA

Leucemia/Linfoma associado ao vírus HTLV-1

Informações gerais

Apresentação: 100 mg – cápsula; 10 mg/mL – solução injetável; 10 mg/mL – xarope.

CID-10: C844; C915

Esquema terapêutico recomendado:

- dose inicial: 900 mg/dia, por via oral e dividida em 3 doses.

Após um ou dois meses, a dose pode ser reduzida para 600 mg/dia, dividido em 2 doses.

Responsável pelo financiamento: Ministério da Saúde

Observações:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

Mais informações: [Portaria n°54 HTLV](#)

Solicitação do Medicamento

Documentos necessários para dispensação do medicamento

1. Prescrição original elaborada de forma correta, legível e sem rasuras, em uma via, assinada pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
2. [Formulário de solicitação de Medicamentos - HTLV](#), preenchido de forma completa, legível, e sem rasuras, em uma via, assinado pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.

De posse dos documentos mencionados, o paciente ou seu representante deve dirigir-se a uma das [Unidades Dispensadoras de Medicamentos \(UDM\)](#) para entrega dos documentos e retirada dos medicamentos.