

Antídotos

Antídoto	Intoxicação	Dose para Adulto	Dose para Crianças
Atropina	Organofosforado. Carbamatos. Agentes Nervosos.	1-2 mg EV, podendo ser repetido se necessário de forma titulada.	0,02- 0,04 mg/kg EV, podendo ser repetido se necessário de forma titulada. Não utilizar dose menor do que 0,1 mg.
Azul de Metileno	Compostos que formam metahemoglobinemia.	1-2 mg/kg EV lentamente em pelos menos 5 minutos, podendo ser repetido se necessário.	1-2 mg/kg EV em pelos menos 5 minutos, podendo ser repetido se necessário.
Cloreto de Cálcio 10%	Intoxicação Sistêmica por Ácido Hidrofluorídrico. Fluoretos.	5-10 mL EV, podendo ser repetido.	0,1-0,2 mL/kg EV, podendo ser repetido se necessário.
Gluconato de Cálcio 10%	Intoxicação Sistêmica por Ácido Hidrofluorídrico ou Fluoretos.	10-20 mL, EV, podendo ser repetido.	0,2-0,3 mL/kg EV, podendo ser repetido se necessário.
Gluconato de Cálcio Gel 2,5%	Queimaduras em pele por Ácido Hidrofluorídrico.	Tópico	Tópico
Gluconato de Cálcio Solução 10%	Queimaduras em pele e ocular por Ácido Hidrofluorídrico.	Tópico	Tópico
Hidroxibalamina 5 g	Cianetos.	5 g EV, podendo ser repetido se necessário até 10 g.	70 mg/kg, podendo ser repetido se necessário, não excedendo 5 g.
Nitrito de Sódio 30%	Cianetos. Nitrilas. Sulfetos	10 mL EV lentamente, em ao menos 5 minutos.	0,12-0,33 mL/kg EV lentamente, em ao menos 5 minutos.
Oxigênio	Asfixiantes simples e sistêmicos. Cianetos. Compostos que formam metahemoglobinemia Monóxido de Carbono, etc.	100%.	100%.
Pralidoxima	Organofosforados. Agentes Nervosos.	1-2 g EV, em ao menos 10 minutos. Depois devem ser mantido 500 mg/h EV de forma contínua.	20-40 mg/kg EV, em ao menos 10 minutos. Depois deve ser mantido 5-10 mg/kg/h EV de forma contínua.
Tiosulfato de Sódio	Cianetos. Nitrilas.	50 mL EV lentamente, em 10-20 minutos.	1,6 mL/kg EV lentamente, em 10-20 minutos, até o máximo 50 mL.